

СЛИНАВКА И ШАП

БОЛЕСТ СЛИНАВКЕ И ШАПА ЈАВЉА СЕ КОД СВИЊА, ГОВЕДА И МАЛИХ ПРЕЖИВАРА



Ако посумњате на болест, одмах
обавестите ветеринарског
инспектора или вашег ветеринара



КЛИНИЧКИ ЗНАЦИ

Абортуси (побачаји) и
изненадна смрт новорођених
животиња

Анорексија (губитак тежине)

Депресија

Грозница (високатемпература)

Шепавост

Смањена млечност

Саливација (повећано лучење
пљувачке)

Везикуле (мехурићи) и ранице

ИМАЈТЕ НА УМУ!



Код оваца
и коза
болест
често има
блажи
карактер и
теже се
препознаје

КАКО ДА ПРЕПОЗНАТЕ БОЛЕСТ

Ранице на кожи између папака,
што је праћено шепавошћу



Повећана саливација (лучење
пљувачке). Ранице у устима (услед
пуцања везикула)



СЛИНАВКА И ШАП

КАКО СЕ БОЛЕСТ ПРЕНОСИ?



Ако посумњате на болест, одмах
обавестите ветеринарског
инспектора или вашег ветеринара

НАЧИНИ ПРЕНОШЕЊА БОЛЕСТИ



Funded by the
European Union

	ДИРЕКТНИМ КОНТАКТОМ ИЗМЕЂУ ЖИВОТИЊА	Најважнији начин преношења болести је контакт са зараженом животињом
	ЖИВОТИЊСКИ ПРОИЗВОДИ	Следећи најважнији начин преношења болести је исхрана животиња зараженим животињским производима (напр. храњење животиња са одпадцима хране за људе, или сировим млеком)
	МЕХАНИЧКИМ ПУТЕМ	Остали начини преношења болести могу бити путем механичког преноса честице вируса са предмета попут обуће, одеће, ветеринарских инструмената или возила
	ВЕТАР	Преношење ветром није уобичајено али је могуће, поготово ако су у близини велике фарме свиња, и под одређеним климатским условима (ниске температуре и повећана влажност погодују преношењу вируса путем ветра)